

Énumération des variétés de ce Rosier.

ROSA CANDOLLEANA.

R. *Germinibus ovatis, glabris; pedunculis glabris hispide; caulibus ramulisque setis confertissimis minimis subaequalibus tectis; foliis inaequaliter serratis*. THY. R. CAND. p. 7, cum fig. Bibl. univ. des sciences, etc., suite de la Bibl. Brit., tom. 10 (avril 1819), p. 282 — 287, fig.

α. R. CANDOLLEANA *elegans, germinibus pedunculisque glabris; foliis supra viridibus subtus pallidioribus; petiolis villosis subaculeatis; laciniis calycinis intus et margine villosulis, extus glandulis sessilibus praeditis; petalis albis, extus rubro-fasciatis*. THY. l. c.

Notre Rosier REDOUTÉ à *feuilles glauques* se rapproche de cette variété par la disposition de ses fleurs; mais il s'en éloigne par ses aiguillons longs, fermes, inégaux, plus écartés les uns des autres; par ses folioles simplement dentées, ses pétales blancs, semés de points rougeâtres à l'intérieur et au sommet; mais surtout par une différence notable dans le port.

Le *Rosa hispida* (POIRET, Ency. vol. 6, p. 286, n° 15), avec lequel on pourrait confondre le R. CANDOLLEANA *elegans* en diffère, 1° par ses aiguillons épars et fermes; 2° ses folioles tomenteuses en-dessous; 3° ses ramuscules uniflores; 4° par les poils glanduleux qui recouvrent les pédoncules et les tubes des calices. Vulg. LA DE CANDOLLE *élégante*.

β. R. CANDOLLEANA *PENDULA, germinibus ovatis, glabris; pedunculis subhispidis; foliis ellipticis pallide virescentibus, subconcoloribus; fructibus subglobosis, pendulis*. THY. l. c. p. 9.

Cette variété diffère de la précédente par ses folioles beaucoup plus grandes, ses pétales d'un rose-tendre, et ses fruits pendants, comme dans l'*Alpina pendulina*.

Les ramuscules multiflores, les folioles doublement dentées, les divisions calicinales plus longues que le bouton de la fleur, la disposition particulière des aiguillons sétacés, dans le R. CANDOLLEANA *pendula*, l'éloignent suffisamment du R. *Pimpinellifolia* et du R. *Myriacantha*. Vulg. LA DE CANDOLLE à *fruits pendants*.

γ. R. CANDOLLEANA *flavescens, germinibus obovatis turgidis pedunculisque glabris; foliis supra glabris subtus subpubescentibus; petalis pallide flavescents*. THY. l. c. p. 10.

Ce Rosier ne s'élève qu'à un pied ou un pied et demi, au plus; ses fleurs sont d'un jaune pâle: il présente d'ailleurs les mêmes caractères que les précédents dans la disposition des fleurs et la forme des aiguillons. Vulg. LA DE CANDOLLE à *fleurs jaunes*.

Ce groupe de Rosiers a été dédié à M. PYR.-Aug. DE CANDOLLE, professeur d'histoire naturelle à Genève, directeur du Jardin de Botanique, et membre de l'Académie des sciences de la même ville. Il a été publié au commencement de 1819, et présenté avec toutes ses différences, dans un opuscule dont nous avons déjà parlé p. 19 de ce volume, et auquel nous renvoyons.

